

Задачи с параметром: разборы

demidmath.com · Telegram: @demidmath

Сверяй после собственной попытки. Номера совпадают с листом условий; раздел для повторения указан после каждого разбора.

Задача 1

Für $a \in \mathbb{R}$ sei $f_a(x) = ax^3 - 2a$. Bestimmen Sie die Ableitung nach x und berechnen Sie $f'_3(2)$.

Производная $-2a$ равна нулю, а производная ax^3 равна $3ax^2$. Значит, $f'_a(x) = 3ax^2$.

$$f'_3(2) = 3 \cdot 3 \cdot 2^2 = 36.$$

Проверка. Подставим $a=3$ заранее: $f_3(x) = 3x^3 - 6$, $f'_3(x) = 9x^2$ и $f'_3(2) = 36$.

Где легко ошибиться. Не дифференцируй a как переменную x : это разные роли букв.

Повторить в конспекте: «Что фиксируется при вычислении производной».

Задача 2

Bestimmen Sie die Definitionsmenge der Funktion $f_a(x) = 1/(x-a) + 2$ und geben Sie die senkrechte Asymptote an. Es gilt $a \in \mathbb{R}$.

$x-a \neq 0$ означает $x \neq a$. Поэтому $D_a = \mathbb{R} \setminus \{a\}$.

При $x \rightarrow a^-$ функция стремится к $-\infty$, а при $x \rightarrow a^+$ — к $+\infty$. Вертикальная асимптота: $x=a$.

Проверка. При $a=0$ получаем $1/x+2$ с запрещённым $x=0$; при $a=3$ вся картина сдвигается вправо на 3.

Где легко ошибиться. Запрещено значение аргумента $x=a$. Сам параметр a здесь может быть любым вещественным числом.

Повторить в конспекте: «Область определения проверяем до сокращения».

Задача 3

Bestimmen Sie für alle $a \in \mathbb{R}$ die Anzahl und die Lage der reellen Nullstellen von $f_a(x) = x^2 + a$.

Если $a < 0$, число $-a$ положительно: $x = \pm\sqrt{-a}$, два различных нуля.

При $a=0$ единственный нуль $x=0$ имеет кратность два. При $a>0$ правая часть $-a$ отрицательна, действительных нулей нет.

Проверка. $a=-4$ даёт нули ± 2 , $a=0$ — нуль 0, $a=3$ — положительную функцию x^2+3 .

Где легко ошибиться. Не теряй отрицательный корень и различай один двойной нуль и два различных нуля.

Повторить в конспекте: «Как меняется число действительных корней».

Задача 4

Der Graph von $f_a(x)=ax^2+2$ mit $a \in \mathbb{R}$ soll durch $P(-2|14)$ verlaufen. Bestimmen Sie a .

Подставляем координаты: $a \cdot (-2)^2 + 2 = 14$, то есть $4a + 2 = 14$.

$4a = 12$, поэтому $a = 3$.

Проверка. $f_3(-2) = 3 \cdot 4 + 2 = 14$.

Где легко ошибиться. $(-2)^2 = 4$, а не -4 ; производная для условия прохождения через точку не нужна.

Повторить в конспекте: «Что фиксируется при вычислении производной».

Задача 5

Lösen Sie $ax=a$ nach x für alle reellen Werte des Parameters a .

При $a \neq 0$ делим на a и получаем единственное решение $x=1$.

При $a=0$ исходное равенство $0 \cdot x = 0$ верно для любого $x \in \mathbb{R}$. Поэтому множество решений в этом случае — $\mathbb{R}$.

Проверка. При $a=0$ подходят и $x=0$, и $x=7$; при $a=2$ равенство $2x=2$ даёт только $x=1$.

Где легко ошибиться. Ответ $x=1$ для всех a пропускает бесконечно много решений при $a=0$.

Повторить в конспекте: «Особое значение нельзя потерять при делении».

Задача 6

Gegeben ist $f_a(x)=ax^2-4x+1$. Bestimmen Sie a so, dass der Graph an der Stelle $x=2$ eine waagrechte Tangente hat. Es gilt $a \in \mathbb{R}$.

$f'_a(x) = 2ax - 4$. Условие при $x=2$: $4a - 4 = 0$, откуда $a=1$.

Точка касания имеет высоту $f_1(2) = 4 - 8 + 1 = -3$. Касательная — прямая $y = -3$.

Проверка. $f_1(x) = (x-2)^2 - 3$ имеет вершину $(2|-3)$, $f''_1 = 2 > 0$.

Где легко ошибиться. Условие $f_a(2) = 0$ означало бы точку на оси x , которой в задаче не требуют.

Повторить в конспекте: «Наклон и касание дают разные условия».

Задача 7

Bestimmen Sie alle reellen Nullstellen von $f_a(x)=ax^2-2x$. Unterscheiden Sie $a=0$ und $a \neq 0$.

При $a=0$ получаем $f_0(x) = -2x$ с единственным нулём $x=0$.

При $a \neq 0$ равенство $x(ax-2)=0$ даёт $x=0$ или $x=2/a$. Число $2/a$ не равно нулю, поэтому нули различны.

Проверка. Для $a=1$ нули 0 и 2; для $a=-2$ нули 0 и -1 . Подстановка в ax^2-2x даёт нуль.

Где легко ошибиться. Формула $2/a$ не определена при $a=0$. Деление на x потеряло бы нуль 0.

Повторить в конспекте: «Особое значение нельзя потерять при делении».

Задача 8

Untersuchen Sie für $a \in \mathbb{R}$ die Anzahl der reellen Nullstellen von $f_a(x) = x^2 - 2ax + 1$ und geben Sie diese an.

$\Delta = (-2a)^2 - 4 = 4(a^2 - 1)$. При $|a| > 1$ два нуля: $x = a \pm \sqrt{a^2 - 1}$.

При $a = 1$ имеем $(x-1)^2$, один двойной нуль 1. При $a = -1$ имеем $(x+1)^2$, один двойной нуль -1 .

При $-1 < a < 1$ дискриминант отрицателен, действительных нулей нет.

Проверка. Представление $(x-a)^2 + 1 - a^2$ показывает те же случаи по высоте вершины.

Где легко ошибиться. Из $a^2 > 1$ следует $a < -1$ или $a > 1$; отрицательные параметры тоже дают два нуля.

Повторить в конспекте: «Как меняется число действительных корней».

Задача 9

Für $f_a(x) = ax^2 + x$ soll die Tangente an der Stelle $x=2$ die Steigung 5 besitzen. Bestimmen Sie a und die Tangentengleichung.

$f'_a(x) = 2ax + 1$. Из $4a + 1 = 5$ получаем $a = 1$.

$f_1(2) = 2^2 + 2 = 6$, поэтому касательная $y = 6 + 5(x-2) = 5x - 4$.

Проверка. Прямая проходит через $(2|6)$, её наклон 5 совпадает с $f'_1(2)$. Кроме того $x^2 + x - (5x - 4) = (x-2)^2$.

Где легко ошибиться. Наклон 5 не является свободным членом касательной. Для него нужна ещё точка $(2|6)$.

Повторить в конспекте: «Что фиксируется при вычислении производной».

Задача 10

Gegeben ist $f_a(x) = (x^2 - a^2)/(x - a)$, $a \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Definitionsmenge und den Grenzwert für $x \rightarrow a$. Liegt bei $x = a$ eine senkrechte Asymptote vor?

Исходный знаменатель требует $x \neq a$, поэтому $D_a = \mathbb{R} \setminus \{a\}$.

Для $x \neq a$ имеем $(x-a)(x+a)/(x-a) = x+a$. Следовательно, предел при $x \rightarrow a$ равен $2a$.

Предел конечен: вертикальной асимптоты нет. График — прямая $y = x + a$ с выколотой точкой $(a|2a)$.

Проверка. При $x = a + h$, $h \neq 0$ исходная дробь равна $2a + h$ и стремится к $2a$ при $h \rightarrow 0$.

Где легко ошибиться. Нулевой знаменатель сам по себе не доказывает асимптоту. После сокращения $x = a$ всё ещё исключено.

Повторить в конспекте: «Область определения проверяем до сокращения».

Задача 11

Bestimmen Sie alle $a \in \mathbb{R}$, für die der Graph von $f_a(x) = x^2 - 2ax + 4$ die x -Achse berührt. Geben Sie die Berührungspunkte an.

$f'_a(x) = 2x - 2a$, поэтому в возможной точке касания $x_0 = a$.

$f_a(a) = 4 - a^2 = 0$ даёт $a = \pm 2$. При $a = 2$ точка $(2|0)$, при $a = -2$ точка $(-2|0)$.

Функции имеют вид $(x-2)^2$ и $(x+2)^2$, поэтому в обеих точках ось действительно является касательной.

Проверка. $\Delta = 4a^2 - 16$ обращается в нуль именно при $a = \pm 2$, что подтверждает двойные нули.

Где легко ошибиться. Равенство $f'_a(x_0) = 0$ находит вершину любой параболы семейства. Только условие $f_a(x_0) = 0$ выбирает нужные параметры.

Повторить в конспекте: «Наклон и касание дают разные условия».

Задача 12

Gegeben ist $h_a(x) = (x-2)^a + 1$, wobei a eine positive ganze Zahl ist. Bestimmen Sie den Grenzwert für $x \rightarrow -\infty$ getrennt für gerade und ungerade Werte von a . Untersuchen Sie anschließend den Fall $a = -1$ gesondert.

При положительном чётном a имеем $(x-2)^a \rightarrow +\infty$ и $h_a(x) \rightarrow +\infty$. При положительном нечётном a оба предела равны $-\infty$.

Отдельно $a = -1$: $h_{-1}(x) = 1/(x-2) + 1$, область определения $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. При $x \rightarrow -\infty$ дробь стремится к 0 снизу, поэтому $h_{-1}(x) \rightarrow 1$.

Проверка. При $x = -100$: $h_2 = 10405$, $h_3 = -1061207$, $h_{-1} = 101/102 \approx 0,9902$. Эти значения согласуются с направлениями пределов.

Где легко ошибиться. $a = -1$ не входит в случай положительного нечётного показателя; отрицательная степень означает дробь.

Повторить в конспекте: «Целый показатель и направление бесконечности».

Задача 13

Für $a \in \mathbb{R}$ sei $f_a(x) = \sqrt{x+a}$. Die Tangente an der Stelle $x=3$ soll senkrecht zur Geraden $y = -4x + 2$ sein. Bestimmen Sie a , die Definitionsmenge und die Tangentengleichung.

У заданной прямой наклон -4 , поэтому наклон касательной $1/4$. Производная $f'_a(x) = 1/(2\sqrt{x+a})$ определена при $x > -a$.

В $x=3$: $1/(2\sqrt{3+a}) = 1/4$. Отсюда $\sqrt{3+a} = 2$, $3+a = 4$ и $a = 1$.

$D_1 = [-1; +\infty)$. Точка касания $(3|2)$, поэтому $y = 2 + (x-3)/4 = x/4 + 5/4$.

Проверка. $3+1 = 4 > 0$, $f'_1(3) = 1/4$, произведение наклонов $(-4) \cdot (1/4) = -1$. В $x=3$ касательная имеет высоту 2.

Где легко ошибиться. Перпендикулярность не означает просто смену знака наклона. Граница $x = -a$ входит в область функции, но не в область её конечной производной.

Повторить в конспекте: «Наклон и касание дают разные условия».

Задача 14

Untersuchen Sie $f_a(x) = x^3 - 3ax$ für alle $a \in \mathbb{R}$ auf stationäre Stellen und lokale Extrempunkte. Bestimmen Sie die Koordinaten und behandeln Sie $a=0$ ausdrücklich.

$f'_a(x) = 3(x^2 - a)$. При $a < 0$ выражение $x^2 - a$ положительно, стационарных точек и локальных экстремумов нет.

При $a=0$ имеем $f_0 = x^3$. В $x=0$ производная равна нулю, но её знак с обеих сторон положителен. Это стационарный перегиб $(0|0)$, не экстремум.

При $a > 0$ стационарные абсциссы $\pm\sqrt{a}$. Знаки f' : + на $(-\infty; -\sqrt{a})$, - на $(-\sqrt{a}; \sqrt{a})$, + на $(\sqrt{a}; +\infty)$.

Максимум $H(-\sqrt{a}|2a\sqrt{a})$, минимум $T(\sqrt{a}|-2a\sqrt{a})$. Их высоты получены подстановкой в $x^3 - 3ax$.

Проверка. $f''_a(x) = 6x$: при $x = -\sqrt{a}$ она отрицательна, при $x = \sqrt{a}$ положительна. Для $a=1$ точки $H(-1|2)$, $T(1|-2)$.

Где легко ошибиться. Два совпавших решения $x = \pm 0$ при $a=0$ не дают максимум и минимум. Нужна проверка знака производной.

Повторить в конспекте: «Стационарная точка может перестать быть экстремумом».

Задача 15

Für $a, b \in \mathbb{R}$ sei $f(x) = x + a + b/x$ mit $x \neq 0$. Der Graph soll in $T(2|5)$ ein lokales Minimum haben. Bestimmen Sie a und b sowie alle weiteren lokalen Extrempunkte.

$f'(x) = 1 - b/x^2$. Условие $f'(2) = 0$ даёт $1 - b/4 = 0$, поэтому $b=4$.

Из $f(2) = 2 + a + 4/2 = 5$ находим $a=1$. Получаем $f(x) = x + 1 + 4/x$, $x \neq 0$.

Стационарные точки: $1 - 4/x^2 = 0$, то есть $x = \pm 2$. Вторая производная $f''(x) = 8/x^3$.

При $x=2$ имеем $f'' = 1 > 0$ и $f(2) = 5$, минимум подтверждён. При $x=-2$ имеем $f'' = -1 < 0$ и $f(-2) = -3$: второй экстремум — максимум $H(-2|-3)$.

Проверка. На положительной полуоси $x + 4/x \geq 4$, значит $f \geq 5$ с равенством в $x=2$. На отрицательной полуоси подстановка $x = -t$, $t > 0$, даёт $f = 1 - (t + 4/t) \leq -3$.

Где легко ошибиться. Решив $f'(2) = 0$, ещё нельзя забыть высоту 5 или объявить минимум без проверки. Точка $x=0$ не принадлежит графику.

Повторить в конспекте: «Стационарная точка может перестать быть экстремумом».

Задача 16

Für $a > 0$ begrenzen der Graph von $f_a(x) = a - x^2$ und die x -Achse eine Fläche. Bestimmen Sie $A(a)$. Für welchen Wert von a beträgt der Flächeninhalt 36 Flächeneinheiten?

Нули: $x = \pm\sqrt{a}$. Между ними $a - x^2 \geq 0$.

$$A(a) = 2 \int_0^{\sqrt{a}} (a - x^2) dx = 2[a \cdot x - x^3/3]_0^{\sqrt{a}} = (4/3)a\sqrt{a}.$$

Из $A=36$ получаем $a\sqrt{a}=27$. Пусть $t=\sqrt{a}>0$; тогда $t^3=27$, $t=3$ и $a=9$.

Для найденной функции $y=9-x^2$ границы области $x=-3$ и $x=3$.

Проверка. $2 \int_0^3 (9-x^2) dx = 2(27-9) = 36$. Положительный кубический корень единственен.

Где легко ошибиться. Границы зависят от параметра. Нельзя интегрировать от $-a$ до a : нули равны $\pm\sqrt{a}$.

Повторить в конспекте: «Параметр в границах интеграла».

Задача 17

Bestimmen Sie für alle $a \in \mathbb{R}$ die Anzahl der verschiedenen reellen Lösungen von $ax^2 - 2(a+1)x + a = 0$. Geben Sie die Lösungen an und begründen Sie, warum der Fall $a=0$ vor der quadratischen Lösungsformel zu prüfen ist.

При $a=0$ остаётся $-2x=0$: единственное решение $x=0$.

При $a \neq 0$ дискриминант $\Delta = 4[(a+1)^2 - a^2] = 4(2a+1)$. Если $a < -1/2$, действительных решений нет.

При $a = -1/2$ дискриминант нулевой: $x = (a+1)/a = -1$, один двойной корень.

При $a > -1/2$ и $a \neq 0$ два различных решения: $x = [a+1 \pm \sqrt{2a+1}]/a$. Эти случаи вместе с $a=0$ исчерпывают все вещественные параметры.

Проверка. Для $a=-1$ уравнение $-x^2-1=0$ не имеет вещественных корней; для $a=-1/2$ получаем $-(x+1)^2/2=0$. Для $a=1$ корни $2 \pm \sqrt{3}$ имеют сумму 4 и произведение 1, как требует $x^2-4x+1=0$.

Где легко ошибиться. При $a=0$ дискриминант положителен, но уравнение линейное. Правило « $\Delta > 0$ — два корня» здесь неприменимо.

Повторить в конспекте: «Особое значение нельзя потерять при делении».

Задача 18

Bestimmen Sie für $x > 0$ eine Stammfunktion von $f_m(x) = x^m \ln(x)$ für alle $m \in \mathbb{R}$. Behandeln Sie $m=-1$ gesondert und prüfen Sie beide Formeln durch Ableiten.

Для $m \neq -1$: $u = \ln(x)$, $du = dx/x$, $v = x^{m+1}/(m+1)$. По частям получаем $x^{m+1} \ln(x)/(m+1) - [1/(m+1)] \int x^m dx$.

Следовательно, $F_m(x) = x^{m+1}[\ln(x)/(m+1) - 1/(m+1)^2] + C$ при $m \neq -1$.

При $m=-1$ положим $t = \ln(x)$, $dt = dx/x$. Тогда $\int \ln(x)/x dx = \int t dt = (\ln(x))^2/2 + C$.

Проверка первой формулы: производная произведения равна $x^m[\ln(x) - 1/(m+1)] + x^m/(m+1) = x^m \ln(x)$. Производная второй: $(\ln(x)) \cdot 1/x$. Обе проверки выполнены на $x > 0$.

Проверка. При $m=0$ первая формула даёт $x \ln(x) - x + C$; при $m=1$ — $x^2 \ln(x)/2 - x^2/4 + C$. Их производные $\ln(x)$ и $x \ln(x)$. Для $m=-1$ формула с делением на $m+1$ не используется.

Где легко ошибиться. Подстановка $m=-1$ в формулу первого случая приводит к делению на ноль. Особый параметр исследуют в исходном интеграле.

Повторить в конспекте: «Почему в первообразной возникает отдельный случай».