

## EPM Aufgabe — Cosinusfunktion und Fläche

### ■ Originale Aufgabenstellung

Gegeben ist die Funktion

$$f_a(x) = 1 - a \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad a \in \mathbb{R}.$$

a) Bestimmen Sie  $a$  so, dass der Graph von  $f$  an der Stelle  $x = \frac{\pi}{3}$  die Steigung  $\frac{1}{4}$  besitzt.

b) Berechnen Sie die Extrempunkte von

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

im Intervall  $(-\pi; 3\pi)$ ; die Art der Extrempunkte ist auch anzugeben.

c) Die Gerade

$$g(x) = \frac{x}{\pi}$$

schneidet  $f$  aus b) an den drei Stellen  $0, \pi$  und  $2\pi$ . Berechnen Sie den Inhalt jener Fläche, die von  $f$  und  $g$  im Intervall  $[0; 2\pi]$  begrenzt wird.

### ■ Перевод условия

В пункте а нужно выбрать  $a$  так, чтобы при  $x = \pi/3$  график имел наклон  $1/4$  (**Steigung**).

В пункте б для  $f(x) = 1 - \cos(x/2)$  требуется найти точки экстремума (**Extrempunkte**) на открытом интервале  $(-\pi; 3\pi)$  и указать их вид.

В пункте с дана прямая  $g(x) = x/\pi$  и три пересечения:  $0, \pi, 2\pi$ . Нужно найти суммарную площадь между графиками на  $[0; 2\pi]$ .

## Идея решения

В пункте а известно, как наклонён график при  $x = \pi/3$ . Производная в этой точке должна равняться заданному наклону  $1/4$ . Поэтому сначала найдём  $f'_a(x)$ , сохраняя  $a$  как постоянное число, и только затем подставим  $x = \pi/3$ . Получится уравнение для  $a$ . Аргументы здесь заданы в радианах (**Bogenmaß**); на калькуляторе используем RAD.

## a) Parameter über die Steigung

Производная косинуса даёт минус, который сокращается с минусом перед  $a$ . Внутренний аргумент  $x/2$  даёт ещё множитель  $1/2$  по правилу цепочки. Поэтому результат равен  $(a/2) \sin(x/2)$ .

### Ableitung und Bedingung

**Gegeben.**

$$f_a(x) = 1 - a \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad x_0 = \frac{\pi}{3}, \quad k = \frac{1}{4}.$$

**Ansatz.**

$$f'_a(x_0) = k.$$

**Rechnung.**

$$f'_a(x) = \frac{a}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right).$$

$$f'_a\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{a}{2} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a}{4}.$$

$$\frac{a}{4} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad a = 1.$$

**Antwort.**

$$\boxed{a = 1}$$

### Комментарий

Внутренняя функция  $x/2$  имеет производную  $1/2$ . Этот множитель появляется по правилу цепочки; аргумент синуса остаётся  $x/2$ . Поэтому при  $x = \pi/3$  вычисляем  $\sin(\pi/6)$ , а не  $\sin(\pi/3)$ .

## b) Extrempunkte

Параметр уже найден, теперь исследуем обычную функцию. Синус равен нулю при аргументах  $k\pi$ , где  $k \in \mathbb{Z}$ . В нашем случае аргумент равен  $x/2$ , поэтому абсциссы имеют вид  $2k\pi$ . Из них в заданном интервале лежат только 0 и  $2\pi$ . Здесь буква  $k$  нумерует целые периоды; наклон из пункта а уже не используется.

**E Kritische Stellen****Gegeben.**

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad x \in (-\pi; 3\pi).$$

**Ansatz.** Die Funktion ist auf dem offenen Intervall differenzierbar; an inneren Extremstellen gilt daher

$$f'(x) = 0.$$

Die ausgeschlossenen Randpunkte werden nicht als Extrempunkte mitgezählt.

**Rechnung.**

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right).$$

$$\frac{1}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{2} = k\pi \quad \Rightarrow \quad x = 2k\pi.$$

Im Intervall  $(-\pi; 3\pi)$  liegen:

$$x = 0, \quad x = 2\pi.$$

**E Art und Punkte****Ansatz.** Zur Art der Extrempunkte verwenden wir die zweite Ableitung:

$$f''(x) = \frac{1}{4} \cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

**Rechnung.** Für  $x = 0$ :

$$f''(0) = \frac{1}{4} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Tiefpunkt.}$$

$$f(0) = 1 - \cos(0) = 0.$$

Für  $x = 2\pi$ :

$$f''(2\pi) = \frac{1}{4} \cos(\pi) = -\frac{1}{4} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Hochpunkt.}$$

$$f(2\pi) = 1 - \cos(\pi) = 2.$$

**Antwort.**

$$\boxed{T(0|0), \quad H(2\pi|2)}$$

## c) Fläche zwischen $f$ und $g$

На первом промежутке выше прямая, на втором — кривая. Проверим это одной подстановкой внутри каждого промежутка и запишем положительные высоты полосок. Для вычисления достаточно одной первообразной разности  $f - g$ ; на первом участке её интеграл будет отрицательным, поэтому берём модуль.

### Fläche aufteilen

#### Gegeben.

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad g(x) = \frac{x}{\pi}.$$

Die Schnittstellen sind

$$x = 0, \quad x = \pi, \quad x = 2\pi.$$

**Ansatz.** Die Differenz  $f - g$  ist stetig, und laut Angabe gibt es nur die drei Schnittstellen  $0, \pi$  und  $2\pi$ . Ein Testwert pro Teilintervall genügt:

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} > 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = f\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{3}{2} = g\left(\frac{3\pi}{2}\right).$$

Also liegt auf  $[0, \pi]$  die Gerade  $g$  über  $f$  und auf  $[\pi, 2\pi]$  der Graph von  $f$  über  $g$ .

$$A = \int_0^{\pi} (g(x) - f(x)) dx + \int_{\pi}^{2\pi} (f(x) - g(x)) dx.$$

При интегрировании  $\cos(x/2)$  возникает  $2 \sin(x/2)$ : его производная равна  $2 \cdot \frac{1}{2} \cos(x/2) = \cos(x/2)$ . Постоянную  $1/\pi$  в последнем слагаемом выносим за знак интеграла.

### Rechnung

#### Rechnung.

$$f(x) - g(x) = 1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x}{\pi}.$$

Eine Stammfunktion ist

$$F(x) = x - 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x^2}{2\pi}.$$

$$F(\pi) = \pi - 2 - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - 2, \quad F(0) = 0.$$

$$A_1 = |F(\pi) - F(0)| = \left| \frac{\pi}{2} - 2 \right| = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

$$F(2\pi) = 2\pi - 0 - \frac{4\pi^2}{2\pi} = 0.$$

$$A_2 = F(2\pi) - F(\pi) = 0 - \left(\frac{\pi}{2} - 2\right) = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

$$A = A_1 + A_2 = 4 - \pi.$$

**Antwort.**

$$A = 4 - \pi \approx 0,858 \text{ FE}$$

#### **Комментарий**

На участке, где порядок графиков не меняется, отрицательный интеграл можно исправить модулем (**Betrag**) или поменять порядок функций. Если порядок меняется, сначала разбиваем область: модуль общего интеграла не возвращает взаимно уничтожившиеся площади.

#### **Typische Fehler**

- Bei a)  $\sin(\frac{\pi}{3})$  statt  $\sin(\frac{\pi}{6})$  einsetzen.
- Extremstellen nennen, aber die  $y$ -Koordinaten nicht mit  $f(x)$  berechnen.
- Die Fläche mit einem einzigen Integral von 0 bis  $2\pi$  rechnen und die Vorzeichenaufhebung übersehen.